

| NOME GENÉRICO | TEMPO PARA CONCENTRAÇÃO MÁX | ELIMINAÇÃO/ MEIA-VIDA |
|--|---|---|
| ANALGÉSICOS | | |
| ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) ME | Via Oral (VO): 1 h (1-2) Via Retal (VR): 1 h (1,8-4,8) | 4 h (2-4) |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) | VO: CP revestido: 20 min VO: solução efervescente 15 min | 6 h (4,7-9) dose-dependente |
| DICLOFENACO | VO Lib. Imediata: (Diclofenaco de Potássio): 1 h (0,33-2) VO Lib. Ext: (Diclofenaco de Sódio): 2 h (1-4) VR: 30 min | 2 h |
| CELECOXIBE (COX-2) | VO: 3 h | 11 h |
| IBUPROFENO ME | VO: 1 h (1,4-1,9 h) | 4 h (2-4) |
| CETOROLACO | VO: 1 h Subcutânea (SC): 1 h Intramuscular (IM): 1 h Intravenosa (IV): 1-3 min | 6 h (2,4-9) |
| NAPROXENO | VO Lib. Imediata: 2 h (2-4) | 12 h (12-15) |
| INDOMETACINA | VO/VR: 2 h | 4,5 h (2,6-11) |
| OPIOIDES | | |
| CODEÍNA ME | VO: 1 h (1-2) VR: 30 min IM: 30 min | 4 h (3,5- 5,3) |
| FENTANIL | Epidural: 30 min Intratecal: 24 min (20-40) SC / IM: 30 min IV: 15 min (6-15) Transdérmico (TD): 12-24 h | 4 h (3,3-4,1) TD: trocar adesivo a cada 72h |
| HIDROCODONA - EM ASSOCIAÇÃO COM ACETAMINOFENO | VO Lib. Imed: 1 h (1,3) VO Lib. Ext: 5 h | Lib. Imed: 4 h (3,8-4,5) Lib. Ext: 8 h |
| HIDROMORFONA | VO Lib. Imediata: 1 h (48-60 min) SC / IM: 30 min IV: 15 min (6-15) Epidural: 8 min | 4 h (3-4) |
| METADONA | VO: 2-4 h | Bifásica (variável) Fase inicial: 12-24 h; 2ª fase: + 55 h |
| MORFINA ME | VO Lib. Imed: 1 h VO Lib. Ext: 4 h (3-6) SC/IM: 30 min IV: 15 min (6-15) | VO Lib. Imed- 4 h VO Lib. Ext: 2-3 dias (para a dose completa) |
| OXICODONA | VO Lib. Imed: 1 h VO Lib. Ext: 5 h | VO Lib. Imediata: 4 h (3-5) VO Lib. Ext: 4 h (3-5) |
| REMIFENTANIL | 1-3 min | 5 min (3-10) |
| SUFENTANIL | SC: 30 min IV: 15 min (6-10) | 2,5 h |
| TRAMADOL | VO: 2 h | Tramadol: 6,3 h Metabólito ativo: 7,4 h |
| ANTICOLINÉRGICOS | | |
| ATROPINA | VO: 1 h IM: 30 min | Bifásica: Inicial ~ 2 h 2º pico: 12,5-38 h |
| GLICOPIRROLATO | SC/IM: 10 min | 1 h (0,55-1,25) |
| HIOSCINA ME | VO Lib. Imed: 30 min VO Lib. Ext: 2,5 h | VO Lib. Imed: 3,5 h VO Lib. Ext ≈ 7 h |
| ESCOPOLAMINA | VO: 1 h SC: 30 min Adesivo: 4 h | 8 h (7-9) |

| NOME GENÉRICO | TEMPO PARA CONCENTRAÇÃO MÁX | ELIMINAÇÃO/ MEIA-VIDA |
|--|--|---|
| CORTICOSTERÓIDES | | |
| DEXAMETASONA ME (EFEITO SEGUE MEIA-VIDA BIOLÓGICA) | VO Cps/elixir: 1 h (1-2) SC/IM: 30 min IV: 15 min (6-15) | Plasmática: 2 h (1,8-3,5) Biológica: 36-54 h |
| PREDNISONA (EFEITO SEGUE MEIA-VIDA BIOLÓGICA) | VO: 1,5 h (1-2) | Plasmática: 2,5 h (2-3) Biológica: 18-36 h |
| BENZODIAZEPÍNICOS | | |
| ALPRAZOLAM | VO: 1 h | 11,2 h |
| CLONAZEPAM | VO: 2 h (1-4) VR: 10-30 min | 30 h (19-50) |
| DIAZEPAM ME | VO: 0,89-1,32 h VR gel: 1,5 h IM: 1 h IV: 8 min | 45 h Metabólito ativo: 30-100 h |
| FLURAZEPAM | VO: 1 h | 8 h |
| LORAZEPAM | VO: 1 h SC/IM: 30 min | 12 h Metabólito ativo: 12-18 h |
| MIDAZOLAM ME | SC/IM: 30 min IV: 15 min (6-15) | 2 h (1-3) |
| OXAZEPAM | VO: 1 h | 12 h (5-15) |
| TEMAZEPAM | VO: 1,5 h | 12 h (10 - 15) |
| GABA_A AGONISTAS NÃO BENZODIAZEPÍNICOS | | |
| ZOPICLONE | VO: 1,5 h | 6 h |
| ZALEPLON | VO: 1 h | 1 h |
| ZOLPIDEM | VO: 1,6 h | 2,5 h (1,5-7) |
| ANTIPSIÓTICOS | | |
| CLORPROMAZINA (SEDATIVO) | VO: 1 h SC / IM: 30 min IV: 15 min (6-15) | 24 h (23-37) |
| HALOPERIDOL (NÃO-SEDATIVO) ME | VO: 1 h SC/IM: 30 min IV: 15 min (6-15) | 21 h (10-38) |
| OLANZAPINA (SEDATIVO) | VO: 6 h IM: 30 min (15-45) | 30 h (21-54) |
| PROCLORPERAZINA | VO/PR: 2 h (1,5-5) | 8 h (6,8-9) |
| QUETIAPINA (SEDATIVO) | VO: 1,5 h | 6 h |
| RISPERIDONA (NÃO SEDATIVO) | VO: 1 h (1-2) | PO: 3 h Metabólitos ativos: 21-30h |
| LAXATIVOS | | Resposta inicial |
| BISACODIL (ESTIMULANTE) | VO: 6-12 h VR: 15-60 min | -- |
| DOCUSATO DE Na+ OU DE Ca++ (SURFACTANTE) ME | VO: 1-3 dias | -- |
| GLICERINA (IRRITANTE) | VR: 15-30 min | -- |
| LACTULOSE (OSMÓTICO) ME | VO: 24-48 h | -- |
| CITRATO DE MAGNÉSIO (OSMÓTICO) | VO: 0,5-3 h | -- |
| POLIETILENOGLICOL | VO: 24-72 h | -- |
| PSYLLIUM (NÃO ABSORVÍVEL) | VO: 12-24 h (+3dias) | -- |
| SENE (ESTIMULANTE) ME | VO: 6-12 h VR: 0,5 - 2 h | -- |
| FOSFATO DE SÓDIO (OSMÓTICO) | VR: 0,5-3 h | -- |
| SORBITOL (OSMÓTICO) | VO: 0,5-3 h | -- |
| ANTAGONISTAS RECEPTORES MU OPIOIDES (PERIFÉRICOS) | TEMPO PARA CONCENTRAÇÃO MÁX | ELIMINAÇÃO/MEIA-VIDA |
| METILNALTREXONE | SC: 30 min | SC: 2 h |

| NOME GENÉRICO | TEMPO PARA CONCENTRAÇÃO MÁX | ELIMINAÇÃO/ MEIA-VIDA |
|---|--|--|
| ANTIDEPRESSIVOS | | |
| AMITRIPTILINA ME | VO: 4 h (2-12) | 15 h (10-50) Metabólito ativo: Nortriptilina |
| CITALOPRAM | VO: 4 h | 35 h |
| DESIPRAMINA | VO: 3-6 h | 14,3-24,7 h variável na 1ª passagem |
| DOXEPINA POTENTE ANTAGONISTA H ₁ | VO: 1 h | 16,8 h (8-25) Metabólitos ativos: 51,3 h (33,2-80,7) |
| DULOXETINA | VO: 6 h | 12,5 h (9,2-19,1) |
| ESCITALOPRAM | VO: 5 h | 30 h (27-32) |
| FLUOXETINA ME | VO: 7 h (6-8) | 5 dias (4-6) Metabólitos ativos: 16 dias |
| IMIPRAMINA | VO: 1 h | 12 h (8-12) Metabólito ativo: Desipramina |
| NORTRIPTILINA | VO: 1 h | 40 h (20-100) |
| SERTRALINA | VO: 4 h (4-8) | 24 h Metabólitos ativos: 35 h (62-104) |
| TRAZODONA | VO: 1,5 h (0,5-2) | 7 h |
| VENLAFAXINA | VO Lib. Imed: 2 h (1-2) VO Lib. Ext: 5,5 h | 5 h Metabólitos ativos: 11 h |
| PSICOESTIMULANTES | | |
| METILFENIDATO | VO Lib. Imed: 1-3 h VO Lib. Ext: 1,5-7 (variável) | VO Lib. Imed: 3 h (2-7) VO Lib. Ext: 4 h (2,5 - 7) |
| OUTROS | | |
| BACLOFENO | VO: 2 h | 3 h (2,5-4) |
| CICLIZINA | VO: 2 h | 13 h (7-48) |
| CICLOBENZAPRINA | VO: 4 h | 18 h (9-41) |
| DIFENDRAMINA (ANTAGONISTA DO RECEPTOR H ₁) | VO: 2 h (2-4) | 6 h (2-8) Metabólitos ativos: 8,6-10h |
| FLECANIDA (ANTIARRÍTMICO DA CLASSE 1C) | VO: 3 h (1-6) VO capsula: 1-8 h EV: 15 min | 20 h (12-30) |
| LOPERAMIDA (ANTIARRÉICO) | VO: 4-5 h | 10-12 h |
| MEPERIDINA / PETIDINA | IM: 30 min | 3 hr (3,2 - 3,7) Metabólitos tóxicos 24-48 h |
| METOCLOPRAMIDA (DOPAMINERGICO) ME | VO/VR: 1 h (1-3) SC: 30 min EV: 15 min | 6 h (5-6) |
| METRONIDAZOL | VO: 1-2 h VR: 3 h EV: ao final da infusão | 6-14 h |
| MEXILETINA (ANTIARRÍTMICO DA CLASSE 1B) | VO: 2,5 h (1-4) | VO: 12 h (6-17) |
| MISOPROSTOL (ANÁLOGO DA PROSTAGLANDINA E ₁) | Plasma: 15 min Max ↓ H ⁺ : 60-90 min | Plasma: 30 min (20-40) |
| OCTREOTIDE (ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA) | SC: 15-30 min | 1,5 h |
| ONDANSETRONA (ANTAGONISTA DO RECEPTOR SEROTONINÉRGICO) ME | VO: 1 h (1-2,2) IM: 0,7 h EV: 10 min após o término da infusão | 6 h (3,1-5,8) |
| OXIBUTININA | VO: 1h Patch Transdérmico: 17 h (10-28) | VO: 2,5 h (2-3) TD: 7,5 h (7-8) |
| TANSULOSINA | VO: 4-5 h | 12 h (9-15) |

| NOME GENÉRICO | TEMPO PARA CONCENTRAÇÃO MÁX | ELIMINAÇÃO/ MEIA-VIDA |
|--|---|---|
| ANESTÉSICOS | | |
| LIDOCAINA | IM: 30 min | 1,5 - 2 h |
| ÓXIDO NITROSO | Rápido | 5 min |
| ANTICONSULSIVANTES | | |
| CARBAMAZEPINA | VO Lib. Imed: 4 h VO mastigável: 6 h VO suspensão: 1,5 h | 12 h (12 - 17) |
| FOSFENITOÍNA (PRÓ DROGA DA FENITOÍNA) | SC/IM: 30 min EV: imediato (ao final da infusão) | Conversão para fenitoína: 15 min Fenitoína: 7 - 42 h |
| GABAPENTINA | VO: 2 h (1,5-4) | 6 h (5 - 7) |
| LEVETIRACETAM | VO Lib. Imed: 1 h VO Solução: 1 h VO Lib. Ext: 4 h EV/SC: 1 h | 7 h (6 - 8) |
| FENOBARBITAL | VO: 10 h (8-12) SC/IM: 2 h (1-3) EV: 30 min | 96 h (50 - 120) |
| FENITOÍNA | Lib. Imed VO: 1-2 h EV: 25 min (20-25) | VO: 7 - 42 h |
| PREGABALINA | 1,5 h (1-1,5) | 6 h (5 - 6,5) |
| ÁCIDO VALPRÓICO | VO: Cápsulas de ácido Valpróico - 2 h (1-4) VO: Comprimido de divalproato: 4-8 h VO: Cápsulas de divalproato <i>sprinkle</i> : 3,3-4,8 h VO: Solução de valproato de sódio: 1,2 h VR: solução de ácido valpróico diluída: 3,1 h EV: Depacon®: ao final da primeira hora de infusão | 12 h (6 - 17) |
| DIURÉTICOS | | |
| BUMETANIDA | VO: 1-2 h IM: 30 min EV: 5 min | 60-90 min |
| FUROSEMIDA | VO: 1,5 h (comprimido) EV: 6-10 min | 2 h |
| METOLAZONA | VO: 8 h | 10 h (8 - 14) |
| ESPIRONOLACTONA | VO: 2 h (1-3) | 1,5 h (1,3 - 2) Metabólito ativo: 17 h (9 - 23) |
| TORASEMIDA | VO: 1 h | 4 h (3-6) |
| ANTIÁCIDOS | | |
| CIMETIDINA (ANTAGONISTA DO RECEPTOR H ₂) | VO: 60 min (45-90) IM: 15 min | 2 h Metabólitos ativos: 2,2 h |
| FAMOTIDINA (ANTAGONISTA DO RECEPTOR H ₂) | VO: 2 h (1-3,5) | 3 h (2,5-3,5) |
| LANSOPRAZOL (IBP) | Grânulos revestidos entéricos: 2 h (1,5-3) | < 2 h Metabólitos ativos: 3 h |
| OMEPRAZOL (IBP) | VO: 2 h (0,5-3,5) | 1 h |
| PANTOPRAZOL (IBP) | VO: 2,5 h | 1 h |
| RANITIDINA (ANTAGONISTA DO RECEPTOR H ₂) | VO: 1 h (0,5-2) IM: 15 min | 2,5 h (2-3) |
| SUCRALFATO | VO resposta inicial: 1h | Duração: 6 h |